



**МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

Руководителям  
медицинских организаций  
края  
(по списку)

Красной Армии ул., д. 3, г. Красноярск, 660017  
Факс: (391)211-01-36  
Телефон: (391)211-51-51, 211-48-97  
E-mail: office@kraszdraz.ru  
<http://www.kraszdraz.ru>

[МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА]

На №

Об экстренной профилактике  
заболеваний, передающихся клещами

Уважаемые руководители!

В рамках реализации государственной программы Красноярского края «Развитие здравоохранения» в учреждения приказом министерства здравоохранения Красноярского края от 02.03.2026 г. № 193-орг (копия приказа прилагается) распределены:

- иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита для детей;
- вакцина против клещевого энцефалита для взрослых, из числа социально незащищенных слоев населения инвалиды и лица старше 60 лет, проживающих в территориях Красноярского края с высоким уровнем заболеваемости клещевого вирусного энцефалита.

Иммуноглобулин необходимо применять для экстренной пассивной иммунопрофилактики клещевого вирусного энцефалита только детям (за исключением иностранных граждан) в возрасте до 7 лет, а также детям старше 7 лет, не привитым против клещевого энцефалита в связи с медицинскими противопоказаниями, вне зависимости от места проживания ребенка на территории края и Российской Федерации. Противопоказания к вакцинации против клещевого вирусного энцефалита должны подтверждаться выпиской из медицинской документации из амбулаторно-поликлинического учреждения по месту проживания (прикрепления) ребенка, поскольку в соответствии с инструкцией по применению иммуноглобулина допускается его отсроченное применение (применение не позднее 4-ого дня после укуса клеща).

Дети до 18 лет, прибывшие из Украины, ДНР, ЛНР получают экстренную профилактику клещевого энцефалита бесплатно по предъявлении документа «Гражданина с временным убежищем».

Приказом министерства здравоохранения Красноярского края от 12.03.2026 г. № 223-орг (копия приказа прилагается) распределены вакцины для профилактики клещевого энцефалита для детей школьного возраста.

Министерство здравоохранения Красноярского края информирует о том, что лабораторное исследование клещей на наличие переносчиков заболеваний, передающихся иксодовыми клещами, не включено в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае (далее - программа государственных гарантий).

Экстренная профилактика после присасывания клеща и обнаружения в нем вируса клещевого энцефалита лицам старше 18 лет показана не болевшим клещевым вирусным энцефалитом (далее – КВЭ), не вакцинированным ранее против КВЭ людям, а также имеющим незавершённый или дефектный вакцинальный курс не позднее 4-ого дня после укуса клеща.

Разрешенным средством экстренной профилактики для взрослого населения также является лекарственный препарат йодофеназон (йодантипирин). Препарат назначается после присасывания клеща и при обращении пострадавших на более поздних сроках (позже 3-4 дней), когда введение иммуноглобулина не показано. Препарат назначается на 5 дней по схеме перорально по 0,3 г 3 раза в день 2 дня, затем по 0,2 г 3 раза в день 2 дня, затем по 0,1 г 3 раза в день в течение следующих 5 дней. Препарат противопоказан детям до 14 лет, при беременности и лактации. Совместно йодантипирин и противоклещевой иммуноглобулин не применяются.

Граждане старше 18 лет, прибывшие из Украины, ЛНР, ЛНР не болевшим клещевым вирусным энцефалитом (далее – КВЭ), не вакцинированным ранее против КВЭ людям, а также имеющим незавершённый или дефектный вакцинальный курс, не застрахованным по ДМС назначается экстренная профилактика клещевого энцефалита лекарственным препаратом йодофеназон (йодантипирин).

В случае присасывания клеща и при обнаружении у клеща боррелий, или в случаях, когда невозможно исследование клеща на предмет наличия в нем возбудителей клещевых инфекций, целесообразно назначение экстренной антибиотикопрофилактики, которая назначается в как можно ранние сроки - 24-72 часа, оптимальные сроки - не позднее 5 дня после присасывания клеща. Рекомендуемые сроки и схемы проведения профилактического лечения прилагаются (приложение). По окончании курса профилактического лечения проводится контрольное клинико-лабораторное обследование (ИФА – IgM и IgG к боррелиозным антигенам) через 2 недели, 1 и 3 месяца для своевременного выявления возможного перехода заболевания в хроническое течение.

Руководителям медицинских организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь населению, с целью своевременного проведения экстренной профилактики при укусах клещей необходимо обеспечить:

- обучение работников регистратуры и Call-центров по незамедлительному направлению граждан в кабинеты неотложной медицинской помощи (исключив запись на плановый прием к врачу-терапевту, врачу-инфекционисту);

- оказание неотложной медицинской помощи гражданам, обратившимся за медицинской помощью с положительными результатами исследования клещей, в день обращения, в течение двух часов с момента обращения, в том числе субботу в часы работы кабинета (проведение осмотра пациента, назначение экстренной профилактической терапии с выпиской рецептов на назначенные препараты).

Для работы с населением направляем Памятку по профилактике заболеваний, передающихся иксодовыми клещами для размещения в общественных местах. В связи с ежегодными обращениями в министерство депутатов и глав различных территорий по вопросам организации экстренной профилактики и вакцинации (бесплатной и за личные средства) необходимо заблаговременно информировать их по данным вопросам.

Приложение:

- Перечень краевых учреждений здравоохранения осуществляющих удаление клеща взрослому населению в рамках ОМС и введение ИГ КЭ за счет личных средств граждан или по ДМС в г. Красноярске на 1 л. в 1 экз;

- схема экстренной антибиотикопрофилактики ИКБ у взрослых и детей на 1 л. в 1 экз;

- приказ министерства здравоохранения Красноярского края от 02.03.2026 г. № 193-орг на 7 л.в 1 экз;

- приказ министерства здравоохранения Красноярского края от 12.03.2026 г. № 223-орг на 7 л.в 1 экз;

– Памятка по профилактике заболеваний, передающихся иксодовыми клещами для населения на 3 л. в 1 экз..

|                                                                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Начальник отдела организации<br>медицинской помощи взрослому<br>населению и санаторно-курортного дела | О.Ш. Рахманкулова |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]

Приложение № 1

**Перечень краевых учреждений здравоохранения,  
осуществляющих удаление клеща взрослому населению в рамках ОМС и  
введение ИГ КВЭ за счет личных средств граждан в г. Красноярске**

| Наименование<br>медицинской организации                                                                                                                       | Удаление клеща | Введение ИГ<br>КВЭ за личные<br>средства граждан | Введение ИГ<br>КВЭ в рамках<br>ДМС | Контингенты<br>населения                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| КГБУЗ «Красноярская<br>межрайонная<br>поликлиника № 5»,<br>травмпункт, ул. Дмитрия<br>Мартынова, 28,                                                          | круглосуточно  | нет                                              | круглосуточно                      | Взрослое население<br>Центрального района<br>г. Красноярска                                     |
| КГБУЗ «Красноярская<br>межрайонная клиническая<br>больница скорой<br>медицинской помощи<br>имени Н.С. Карповича»,<br>травмпункт,<br>ул. Курчатова д.17 стр 18 | круглосуточно  | круглосуточно                                    | круглосуточно                      | Взрослое население<br>Октябрьского района<br>г. Красноярска                                     |
| КГБУЗ «Красноярская<br>межрайонная<br>клиническая<br>больница № 7»,<br>травмпункт<br>ул. Ленина 150, корпус 1                                                 | круглосуточно  | круглосуточно                                    | круглосуточно                      | Взрослое население<br>Железнодорожного<br>района<br>г. Красноярска                              |
| КГБУЗ «Красноярская<br>межрайонная клиническая<br>больница № 7»,<br>травмпункт<br>ул.Джамбульская, 19                                                         | круглосуточно  | нет                                              | круглосуточно                      | Взрослое население<br>Советского района г.<br>Красноярска                                       |
| КГБУЗ «Красноярская<br>межрайонная клиническая<br>больница № 7»,<br>травмпункт<br>Красноярский рабочий, 48<br>В                                               | круглосуточно  | круглосуточно                                    | круглосуточно                      | Взрослое население<br>Кировского,<br>Ленинского и<br>Свердловского<br>районов<br>г. Красноярска |

**Схемы экстренной антибиотикопрофилактики ИКБ у взрослых**

|                                     | Разовая доза  | Кратность применения | Способ применения | Длительность курса, дней |
|-------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------|--------------------------|
| Амоксициллин+ Клавулановая кислота* | 0,875 +0,125г | 3 раза в день        | внутрь            | 5                        |
| Амоксициллин*                       | 0,5 г         | 3 раза в день        | внутрь            | 5                        |
| Доксициклин                         | 0,1г          | 2 раз в день         | внутрь            | 5                        |
| Азитромицин**                       | 0,5г          | 1 раз в день         | внутрь            | 5                        |

Препаратом выбора является доксициклин. При назначении позже 5 дня от момента присасывания клеща (но не позднее 10 дня) курс приема доксициклина в той же дозировке продлевается до 10 дней

\* Беременным, лактирующим женщинам, лицам с индивидуальной непереносимостью препаратов тетрациклинового ряда назначается Амоксициллин+ Клавулановая кислота.

\*\* При непереносимости препаратов тетрациклинового ряда.

**Схемы экстренной антибиотикопрофилактики ИКБ у детей**

| Препарат                             | Разовая доза  | Кратность применения | Способ применения | Длительность курса, дней |
|--------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------|--------------------------|
| Амоксициллин+ Клавулановая кислота** | 0,500 +0,125г | 3 раза в день        | внутрь            | 5                        |
| Амоксициллин**                       | 35 мг/кг      | 3 раза в день        | внутрь            | 5                        |
| Доксициклин*                         | 0,1г          | 2 раз в день         | внутрь            | 5                        |
| Азитромицин**                        | 10 мг/кг      | 1 раз в день         | внутрь            | 5                        |

Препаратом выбора является доксициклин. При назначении позже 5 дня от момента присасывания клеща (но не позднее 10 дня) курс приема доксициклина в той же дозировке продлевается до 10 дней

\* детям с 12 лет

\*\* При непереносимости препаратов тетрациклинового ряда и детям до 12 лет назначается Амоксициллин+ Клавулановая кислота, либо Азитромицин.

### О профилактике заболеваний, передающихся клещами

В Красноярском крае практически все территории являются эндемичными по заболеваниям, передающимся клещами, исключения составляют лишь Таймырский Долгано-Ненецкий, Эвенкийский муниципальные районы и город Норильск. Переносчиками клещевых заболеваний являются иксодовые клещи, из них 2,5 – 3 % инфицированы вирусом клещевого энцефалита, 30 % - возбудителем болезни Лайма.

### Как защититься от этих заболеваний?

Самой эффективной мерой профилактики клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) является вакцинация. Прививаться современными вакцинами можно в течение всего года. Оптимальная плановая схема вакцинации состоит из 3 прививок, из которых 1-ую необходимо поучить в октябре-ноябре, 2-е введение в феврале-марте, 3-е через 9-12 месяцев. Далее прививки проводятся 1 раз в 3 года весной до наступления эпидемического сезона. Детям школьного возраста вакцинация осуществляется бесплатно за средства краевого бюджета в образовательных учреждениях после получения информированного согласия родителей. В дальнейшем прививки проводятся из личных средств граждан или за счет средств работодателей.

Если Вы забыли выполнить прививки вовремя, то можно привиться по ускоренной экстренной схеме: 2 прививки вводятся с интервалом в 2 недели, третью прививку необходимо получить через 12 месяцев. Последующие отдаленные ревакцинации проводят 1 раз в 3 года.

Адреса прививочных кабинетов в г. Красноярске для вакцинации взрослого населения за личные средства:

- ул. К.Маркса, 47 КГАУЗ «Красноярский краевой Центр профилактики и борьбы со СПИД» с 8 до 18 часов ежедневно (кроме субботы, воскресенья). Тел. для справок и записи на прием 226-84-10;

- ул. Урицкого, 120, ООО «КрасБиоМед-Иммуно» с 9 до 17 часов ежедневно (кроме субботы, воскресенья) без перерыва на обед. Тел. для справок и записи на прием 211-07-45, 211-07-20, 211-45-15;

- ул. Тамбовская, 3 поликлиника № 1 КГАУЗ «Красноярская межрайонная больница № 5» с 9 до 14 часов, каб. 1-18 ежедневно (кроме субботы, воскресенья). Тел. для справок 234-74-14;

- ул. 26 Бакинских Комиссаров, 4 Консультативно-диагностический центр КГАУЗ «Красноярская межрайонная больница № 5» с 9 до 14 часов, каб. 1-14 ежедневно (кроме субботы, воскресенья). Тел. для справок 234-74-14;



- прим.газ. «Красноярский рабочий», 80 «А» поликлиника № 5 КГАУЗ «Красноярская межрайонная больница № 5» с 9 до 14 часов, каб. 25 ежедневно (кроме субботы, воскресенья). Тел. для справок 234-74-14;

- ул. Павлова, 4, стр.7 КГБУЗ «Красноярская межрайонная поликлиника №1» касса в холле 1 этажа с 8 до 16 часов каб. 1-18.30, ежедневно (кроме субботы, воскресенья). Прививочный кабинет работает в том же режиме. Тел. для справок 262-60-41 и 234-03-21;

– ул. Курчатова, 17, стр. 5, КГУЗ «Красноярская городская поликлиника № 4»: понедельник – пятница - с 8.00 до 20.00; суббота – с 8.00 до 16.00. Тел. Для справок: 234-07-97;

– ул. Воронова, 35Г, КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника №14», поликлиника, с 8 до 16 часов, «Центр Здоровья» (цокольный этаж), ресепшен, ежедневно (кроме субботы, воскресенья). Тел. для справок 222-50-02;

– ул. Тельмана, 14А, КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника №14», поликлиника №1, с 8 до 16 часов, каб. №4 ежедневно (кроме субботы, воскресенья). Тел. для справок 222-50-02;

– ул. Весны, 11, КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника №14», поликлиника № 2, с 8 до 16 часов, каб. №9 ежедневно (кроме воскресенья). Тел. для справок 222-50-02;

– ул. Партизана Железняка, 30 , КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника №14», поликлиника №3, с 9 до 16 часов, каб. 15 ежедневно (кроме субботы, воскресенья). Тел. для справок 222-50-02;

### **Что делать при обнаружении присосавшегося клеща?**

Удаление клеща осуществляется в травматологических пунктах, а также в кабинетах неотложной помощи медицинских организаций.

После удаления клеща необходимо отправить его на исследование.

В г. Красноярске введение специфического иммуноглобулина (ИГ КВЭ) детям до 7 лет бесплатно осуществляется в травматологических пунктах КГБУЗ КМП № 5 по адресу ул. Дмитрия Мартынова, 28 и КГБУЗ КМБ № 7 по адресам: ул. Красноярский рабочий, дом 48 В (правый берег) и ул. Ленина, дом 150 (левый берег).

### **Как защититься от КВЭ если ты не привит?**

Если Вы не привиты, то после присасывания клеща Вам показана экстренная профилактика – введение специфического иммуноглобулина по программе добровольного медицинского страхования (ДМС) или за личные средства. **В рамках программы ДМС помощь (удаление клеща, введение ИГ КВЭ) оказывается медицинскими организациями, указанными в полисе ДМС.** Лицам, получившим прививки в течение последних 3 лет, экстренная профилактика после присасывания клеща не требуется.

Не привитым лицам применение ИГ допускается не позднее 4-ого дня после укуса клеща. Детям дошкольного возраста ИГ вводится бесплатно за

средства краевого бюджета. В случае новых укусов клещом ИГ вводится повторно через один месяц после первого введения препарата.

Вместо ИГ, разрешенным средством профилактики КВЭ для взрослого населения также является лекарственный препарат йодофеназон (торговое наименование йодантипирин), форма выпуска таблетка 100 мг. Препарат назначается после присасывания клеща, в том числе при противопоказаниях к введению ИГ КВЭ и (или) при обращении пострадавших на более поздних сроках (позже 4 дней), когда введение ИГ КВЭ не показано. Препарат принимается по схеме в соответствии с инструкцией к препарату.

Совместное применение йодантипирина и ИГ КВЭ не рекомендуется.

### **Как защититься от боррелиоза?**

В случае присасывания клеща и при обнаружении у клеща боррелий, или в случаях когда исследование клеща на предмет наличия в нем возбудителей клещевых инфекций невозможно, целесообразно назначение антибиотикопрофилактики. Лечение необходимо начать в возможно более ранние сроки, не позднее 3 дня после укуса клеща. Врач осуществит выбор препарата, назначит оптимальные сроки и схемы проведения профилактического лечения.

### **Какие еще существуют средства профилактики?**

Не следует забывать и иные меры профилактики. В эпидемический сезон выходить на природу следует в закрытой одежде, применять средства отпугивающие клещей (репилленты), каждые 30 минут проводить само - и взаимоосмотры.

!!! Прием или введение препаратов не исключает необходимости наблюдения на протяжении 14 дней с измерением температуры 2 раза в день (утром и вечером). Это необходимо для того, чтобы своевременно заметить изменения в состоянии здоровья. Если появилось недомогание, повышенная температура, изменения в месте укуса клеща следует обратиться к специалисту.

**Министерство здравоохранения  
Красноярского края**